

【양돈장 자율방역 핵심 사항】

1. 차단방역 시설 만큼은 완벽히 설치하고 철저히 관리할 것

- 외부울타리, 차량소독시설, 방역실 등 농장 내로 바이러스가 들어오지 못하도록 막는 시설은 철저히 설치하고 유지할 것

※ 야생멧돼지 발생지역의 경우 밀폐형 외부울타리 설치를 검토

※ 우천시, 토사가 유입될 가능성이 있는 부분은 사전 조치

2. 농장에 모든 사람이나 차량의 방문을 최소화 할 것

- (차량) 1유형으로 운영될 수 있도록 시설을 개선하고 철저히 지킬 것
- (사람) 외부인은 물론, 특히 농장 주 출입시 반드시 소독절차를 지킬 것

※ 가급적 방역실에 샤워 시설을 갖추고 내부용 의복으로 환복 후 출입

※ 특히, 출하차량 기사가 축사 내에 들어오는 행위는 철저히 근절

- (위험시기) 특히, 위험시기에는 내부 근로자는 최대한 내부에 머무르게 하고 폐쇄적으로 농장을 유지할 것

3. 내부구역과 외부구역을 나누어 관리할 것

- 농장 여건에 맞도록 자체적인 내부구역과 외부구역을 나누고, 근로자 등에게 충분히 숙지시키고 방역실 등을 비치하여 운영할 것

4. 축사 출입시 반드시 장화를 갈아신고, 소독 후 진입할 것

- 축사입구에 축사별 전용장화와 장화가 충분히 잠길 수 있는 소독조를 비치하고, 장화를 갈아 신고 소독조에 발을 담그고 출입할 것

- 축사 내부용 장화와 외부용 장화의 색상을 다르게 운용할 것

5. 돼지 이동시, 충분한 소독을 실시하고 가급적 이동통로를 만들 것

- 돼지 이동시, 축사 외부의 바이러스가 유입되지 않도록 이동 전, 후 충분한 소독을 실시할 것

- 가급적, 돼지 이동통로는 포장을 하고 바람을 통해 먼지가 들어오지 않도록 조치할 것

- 가능한 경우 고정식 이동통로를 설치할 것

• 돼지열병 항체 80% 미만농가 점검사항 •

돼지열병 청정화를 위해 전국의 모든 한돈농가가 돼지열병 백신을 철저히 접종하고 있습니다. 하지만 일부 농가의 부주의와 소모성 질병 등으로 인해 접종시기를 놓치는 경우 돼지열병 항체가 80% 미만이나오는 농가들이 있습니다.

이에 돼지열병 항체가 100% 달성을 위해 다음과 같이 80% 미만농가 점검사항을 알려드리오니, 농가의 자가 진단에 활용하시기 바랍니다.

<돼지열병 항체가 80% 미만농가 점검사항>

구분	점검사항	예	아니오	비고
접종 관리	돼지 열병백신을 55~70일령에 정확히 접종하고 있다.			
	백신 희석·접종시, 정확한 희석용량·접종량을 확인하고, 사용설명서 내용을 준수한다.			단일백신과 혼합백신 희석량 혼동 주의
	백신접종을 농장직원들이 실시할 경우, 반드시 확인하고 있다. (백신관리 담당자를 지정한다.)			
	백신접종 기록(백신접종 대장)을 하고 있으며, 외부 이동 또는 출하시 예방접종 확인서를 발급하고 있다.			
백신 관리	백신 운반시(백신 수령 → 즉시 냉장고 보관 → 백신 접종) 아이스박스내(얼음팩) 보관상태를 확인하고, 직사광선 노출에 주의한다.			
	백신 수령시, 유통기한을 항상 확인하며 기한이 지난 백신은 반드시 폐기하고 있다.			
	백신접종시 접종두수에 맞추어 희석액을 사용하고, 남은 백신은 반드시 폐기한다.			
냉장고 관리	최고최저온도계를 이용하여 적정온도를 유지하고 있는지 확인하고, 냉장고용적의 60% 이상을 채우지 않는다.			
	전력공급 상태를 수시로 파악하여 혹시 모를 정전에 대비하고 있다.			
	냉장고에 백신과 일반식품을 같이 넣어 보관하고 있지 않다.(백신만 보관하는 전용 냉장고 권장)			

